

Ueber zwei Fälle von
Chorioiditis ossificans.

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doktorwürde
in der
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn

PROF. DR. O. BOLLINGER

ord. ö. Professor etc.

der

hohen medicinischen Fakultät
der k. Ludwigs-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

Jos. Fraas

prakt. Arzt in Landsberg a/L.

München, 1884.

K. Hof- und Univ.-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.

Ueber zwei Fälle von
Chorioiditis ossificans.

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doktorwürde
in der
Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn

PROF. DR. O. BOLLINGER

ord. ö. Professor etc.

der

hohen medicinischen Fakultät

der k. Ludwigs-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

Jos. Fraas

prakt. Arzt in Landsberg a/L.

München, 1884.

K. Hof- und Univ.-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Wenn trotz der relativ zahlreichen Publikationen über Knochenbildungen im Auge dieses Kapitel der pathologischen Anatomie noch nicht als abgeschlossen zu betrachten ist, so dürfte ein weiterer Beitrag, bestehend in der Beschreibung zweier Fälle von Chorioiditis ossificans, nicht unberechtigt erscheinen.

I. Fall.

In dem ersten Falle gehörte der Bulbus einer Pfründnerin des hiesigen Gasteigspitals an, Namens Josepha Königer, 65 Jahre alt, welche am 27.—28. März 1883 daselbst an einem Herzleiden starb. Beide Augen wurden 12 Stunden nach dem Tode enucleirt. Auf dem rechten Auge war vor mehreren Jahren die Graefe'sche Linearextraktion mit breitem Colobom nach unten vorgenommen worden und zwar mit vollkommen günstigem Erfolge. Doch soll der Befund dieses Auges anderweitige Bearbeitung finden. Nur möge noch hervorgehoben werden, daß sich auf dem rechten Auge bei mikroskopischer Untersuchung ein ziemlich ausgedehntes Staphyloma posticum ergab.

Auf dem linken Auge waren vor mehreren Jahren (circa 1876) zahlreiche Cholesteatinkrystalle in der vordern Augenkammer sichtbar, die aber in letzterer Zeit spurlos verschwanden. Das Auge lag circa 3 Wochen in Müller'scher Flüssigkeit und wurde dann der üblichen Procedur mit Alkohol unterworfen. Beim Aufschneiden des Auges entleerten sich in mäßiger Menge krümmelige Massen; unmittelbar nach der Enucleation waren im hinteren Bulbusabschnitte harte Knochen-

massen zu fühlen. Dieses zur Beobachtung vorliegende Auge nun bietet makroskopisch folgendes Verhalten:

Die Sehnervenscheide ist hydropisch, die Arachnoideal-scheide steht als Ganzes von der Duralscheide etwas ab, tritt aber durch zahlreiche Trabekeln mit der Duralscheide einerseits und der Pialscheide andererseits in Verbindung. Der Sehnerv selbst ist etwas verkleinert, auf dem Durchschnitte etwa 1,4 mm. messend. Die Netzhaut ist vollkommen abgelöst, steht nur durch einen schmalen Strang mit dem Nervus opticus in Verbindung und erweitert sich gegen vornen kegelförmig, mit ihrer Basis sich an die Ora serrata anschliessend und so die Form einer Convolvulusblüthe nachahmend. Die Basis des eben erwähnten Kegels ist nach vornen mit einer zarten Lamelle bedeckt, die auch in der Farbe sich etwas unterscheidet von dem kegelförmigen Strange; an einzelnen Stellen dieses Stranges tritt eine Färbung zu Tage, die auf Blutextravasate hinzuweisen scheint; innen ist der Kegel trichterförmig hohl und sieht die Basis des Trichters ebenfalls nach Vornen. Auf der oben erwähnten Lamelle, durch welche die Kegelbasis nach vornen abgeschlossen wird, sitzt in der Richtung nach aufsen und links eine Excrescenz in der Breite von 3 mm. auf, welche bis zu 2 mm. Höhe erreicht, von grünlich grauer Farbe ist, mehrere derbe, warzig aussehende Erhabenheiten trägt, so dass das Ganze ungefähr die Gestalt einer Maulbeere erhält. Das Linsensystem fehlt vollkommen. Die Hornhaut ist dellenförmig eingedrückt. An der Chorioidea lassen sich in dem hinteren Abschnitte deutlich zwei Lamellen unterscheiden, deren innere, schwächere in eine harte, knochenähnliche Schale übergeht. Das Pigment der Retina scheint zu fehlen.

Die eben erwähnte Schale legt sich becherförmig in die hintere Hälfte des Bulbus ein und wird durch den Strang der abgelösten Netzhaut in dem Umfange einer kleinen Linse durchbrochen; die Knochenmasse breitet sich nicht gleichmäfsig nach allen Seiten aus, sondern reicht in der Richtung gegen die

Excrescenz hin weiter nach vornen. Die Mächtigkeit der Knochenplatte wechselt ebenfalls und beträgt im Durchschnitt 2—3 mm. Ein zweiter Knochenherd findet sich, 1 mm im Durchmesser und etwa 4 mm. in der Länge messend, ohne sichtbaren Zusammenhang mit dem rückwärts gelegenen, im vorderen Bulbusabschnitte. Diese Knochenbildung geht ebenfalls von der inneren Schichte der Chorioidea aus und zwar in der Nähe der ora serrata; sie erstreckt sich in der oben erwähnten Ausdehnung, in der Richtung gegen die processus ciliares hin an Mächtigkeit immer mehr zunehmend. Die Oberfläche beider Knochenherde ist leicht gewellt und wechselt daher an Dicke an den verschiedenen Stellen, gegen den Aequator des Auges zu beiderseits abnehmend.

Mikroskopischer Befund.

Der mikroskopischen Beschreibung möge vorausgeschickt werden, daß die zahlreich angefertigten Präparate theils in Haematoxylin-Eosin, theils nach dem Verfahren Norris-Sheakspere gefärbt wurden, theils endlich ungefärbt blieben. Die Knochenmassen wurden nicht entkalkt, sondern die Schnitte direkt durch dieselben geführt.

Die Cornea, die Membrana Descemetii und das Cornealepithel zeigen normales Verhalten. Die Iris ist in ihrem hinteren Abschnitte mit der Cornea verwachsen; die Verwachsung selbst ist keine einfache, sondern eine derartig modificirte, daß die Iris mit einem Fortsatze auf die innere Schichte der Cornea übergreift; dabei bleibt zwischen der innersten Begrenzung der letzteren und der äußersten Schichte der Iris ein spaltförmiger Hohlraum frei. Die circulären Partien des Ciliarmuskels sind in der Zahl ihrer Fasern ziemlich vermindert, während die Längsfasern normales Verhalten zeigen — ein Befund, wie er der hochgradigen Myopie der Patientin entspricht.

In der Bucht des Ueberganges sind ziemlich umfangreiche Blutherde mit zahlreichem, haematogenem Pigment anzutreffen.

Der Schlemm'sche Kanal ist vorhanden, dagegen sind die Fontanal'schen Räume verödet. Das Chorioidealgewebe des rechten, vordersten Abschnittes des Bulbus ist leicht ödematös aufgelockert, die Stromazellen desselben sind durch seröses Exsudat auseinandergedrängt. Das Epithel der pars plana corporis ciliaris desselben Abschnittes bildet zahlreiche verästelte Wucherungen; die Sprossbildung beginnt an den processus ciliares und nimmt immermehr an Mächtigkeit zu, je weiter sie nach rückwärts an die pars plana corporis ciliaris vorschreitet. Die Strecke mag ungefähr 1,5 mm. Länge betragen; zwischen diesen Wucherungen des Epithels findet sich eine bedeutende Menge grossentheils erweiterter Blutgefässe, welche strotzend mit rothen Blutzellen gefüllt sind.

Der linke, vordere Bulbusabschnitt, in welchem sich die kleine warzige Excrescenz als geschrumpfte Linfenkapsel erwies, lässt nur noch reichliches Bindegewebe erkennen, welches von den zahllosen Kapselfalten umschlossen wird. Ausserdem trifft man hie und da myelenglänzende Klumpen innerhalb der Kapsel; von den Linfenröhren ist absolut nichts zu sehen; zwischen den Falten, auf der Aussenfläche derselben, sind bedeutende Blutherde anzutreffen. Ferner ist zahlreiches haematogenes Pigment abgelagert; in dem Bindegewebe innerhalb der Kapsel sind, durch Haematoxylin blau gefärbte, spindelförmige, zerstreute Kerne zu sehen. Die gefaltete Linfenkapsel trägt kein Epithel.

Auf eben diesem Präparate sieht man das Retinalepithel zu langen Schläuchen ausgewachsen, die in das Innere des Auges vorspringen.

Ein Schnitt durch die Verknöcherungsstelle des hintersten Chorioideaabschnittes gibt das Bild spärlicher, atrophischer Stromazellen mit grossen aufgelagerten Drüsen, und zwar theils mit Retinalepithel belegter, theils frei von demselben; haematogenes Pigment findet sich theils zerstreut in Form kleiner Moleküle, theils in grossen Haufen und Klumpen;

zwischen der hinteren Knochenschichte und der Sklera trifft man welliges Bindegewebe mit zahlreichen, deutlichen Kernen.

In der Knochensubstanz selbst finden sich kolossale Hohlräume zwischen den einzelnen Lamellen; dabei bemerkt man an denselben eine schöne concentrische Schichtung; ausgesprochene Knochenkörperchen, von denen sich viele mit Haematoxylin prompt färbten, sind deutlich zu sehen. Der Knochen selbst ist verschieden gefärbt, theils gelblich von Müller'scher Flüssigkeit, theils schön in Eosin tingirt; die Knochenmasse ist deutlich von Gefäßen (Havers'schen Kanälchen) durchzogen. Die Hohlräume, welche der Knochen einschließt, sind durchsetzt von einem ganz zierlichen Netzwerk, mit zahlreich eingelegten Kernen (Bindegewebe) und dadurch werden große Maschenräume gebildet; in diesen Zügen eingelagert, finden sich Kapillaren und kleine Blutextravasate. Ausser den erwähnten Kernen im Balkengewebe liegen an einzelnen Stellen, zu großen Haufen gruppiert: sehr viele weiße Blutzellen. Diese letzteren sind dadurch ausgezeichnet, daß sie große, in Haematoxylin intensiv blau gefärbte Kerne tragen; ferner finden sich Zellen, deren Kerne in Haematoxylin blau, deren Protoplasma in Eosin roth gefärbt ist, endlich hie und da diapedesirte rothe Blutzellen.

Die Knochenbildung im vorderen Abschnitte der Chorioidea zeigt im Allgemeinen ein ähnliches Verhalten wie in den rückwärts gelegenen Partien. Die Chorioidea selbst enthält kurz vor der Stelle, wo sie in Knochengewebe übergeht, ziemlich viel, in Gestalt von rundlichen Klumpen auftretendes haematogenes Pigment; ebenfalls finden sich daselbst mächtig ausgedehnte Blutherde und stark gefüllte Kapillaren. Die am weitesten nach rückwärts gelegenen Theile des Knochengewebes weisen eine ziemlich homogene Struktur auf; erst allmählich treten, an Zahl immermehr zunehmend, deutliche Knochenkörperchen auf, von denen sich die meisten in Haematoxylin sehr deutlich färbten.

Die Knochenmasse theilt sich, von rückwärts nach vornen verfolgt, bald in zwei, dann in mehrere Spangen, welche immer gröfser werdende Räume zwischen sich einschliessen; innerhalb dieser Hohlräume findet sich, weniger stark entwickelt als in den Hohlräumen des hintersten Knochenabschnittes, ein weitmaschiges Netzwerk aus Bindegewebe, mit ziemlich zahlreichen Kernen, nicht selten stöfst man auch hier auf Anhäufungen weifser Blutzellen; desgleichen hie und da auf Blutextravasate und spärlich vertheiltes haematogenes Pigment. Die lamellöse Anordnung ist im Ganzen weniger deutlich ausgesprochen als bei der Verknöcherung des hinteren Chorioideaabschnittes. Die Ablagerung krümmeliger Kalkconcremente scheint ebenfalls weniger intensiv zu sein als dort. Ebenso treten die Havers'schen Kanälchen in geringerer Menge auf.

Ein Querschnitt des Nervus opticus läfst infelweise leere Nervenscheiden, ohne Axencylinder erkennen; die durch Haematoxylin gefärbten Kerne innerhalb der Nervenbündel sind vermehrt. Die Atrophie der Opticusfasern ist besonders deutlich an den peripheren Theilen bemerkbar. In der Pialscheide ist nichts Befonderes zu finden; dagegen trifft man in der Arachnoidealscheide grofse, concentrisch-lamellös gebaute Schollen, welche in ihrer ganzen Erscheinung den Corpora amyacea entsprechen.

Ein Präparat des Retinalepithels, und zwar des über der Knochenchale befindlichen, läfst ein vielfaches Fehlen des Pigments erkennen. Die Form der Epithelzellen ist zum Theil verändert, indem dieselben ihre polygonale Gestalt verloren haben und spindelförmig erscheinen; an vielen anderen Stellen wiederum ist der epitheliale Charakter der Zellen deutlich zu erkennen. Oftmals sind einzelne Kerne langgestreckt und schwach in Haematoxylin tingirt, als Zeichen dafür, dafs diese Zellen im Absterben begriffen sind. An einzelnen Stellen sind Zellen und Kerne ausgefallen; dabei sind fast sämmtliche Kerne in Haematoxylin sehr schwach gefärbt; auf flächenhaf-

ten Präparaten sind einzelne drüsige Einlagerungen zwischen den Epithelzellen anzutreffen. An anderen Orten stehen die Epithelzellen in langen Zügen angeordnet und sind hier mit Pigment ganz dunkel gefärbt; an eben diesen Stellen sind auch die drüsigen Einlagerungen vorhanden, welche sich in Haematoxylin ziemlich intensiv färbten. Ueber dem Knochen selbst ist eine differenzirbare Choriocapillaris als solche nicht mehr vorhanden. In der übrigen Ausdehnung der Choriocapillaris ist der Befund der eines starken Entzündungsvorganges: die meisten Kapillarschlingen sind strotzend mit rothen Blutkörperchen angefüllt, zuweilen sind sogar durch die Ueberfüllung die Kapillaren beträchtlich erweitert. Die Kerne in der Wandung der Kapillarschlingen sind vermehrt, in die Kapillarinterstitien sind zahlreiche rothe Blutkörperchen ausgetreten. In den tieferen Schichten fand ein bedeutender Austritt von zahlreichen weissen Blutkörperchen statt, als weiterer Ausdruck einer stattgehabten Entzündung. An verschiedenen Stellen finden sich ockergefärbte molekulare bis feinkörnige Einlagerungen, welche zweifelsohne dem ausgetretenen Blute ihren Ursprung verdanken. Das Stroma der Chorioidea ist diffus durchsetzt von weissen Blutzellen; zwischen manchen Gefässschlingen finden sich dicht angehäufte Herde davon, in deren Umgebung wiederum grosse Massen haematogenen Pigments auftreten. Zugleich kann man in mässigem Umfange Neubildung von Kapillaren wahrnehmen. —

II. Fall.

Sowohl der makroskopische als insbesondere der mikroskopische Befund hat bei dem zweiten Falle viel Aehnlichkeit mit dem Falle Königer, es möge daher, um allzuhäufige Wiederholungen zu vermeiden, eine etwas kürzere Fassung dieses Falles gestattet sein.

Der Bulbus gehörte einer 32 Jahre alten Frau, Namens Benz, an. Patientin litt als Kind wiederholt an heftigen Augenentzündungen und befand sich auf der Arlt'schen Klinik in

Behandlung. An dem Auge selbst war ein etwa 5 mm. breites, nach Innen und Unten angelegtes Colobom sichtbar. Arlt hatte vor vielen Jahren eine Iridectomy und, wie es scheint, die Extraction der Linse vorgenommen; weshalb, ist nicht mit Sicherheit zu eruiern. Bei seitlicher Beleuchtung erkannte man tief hinter dem Pupillargebiete deutlich zwei Membranen, von denen die vordere ein äußerst zartes Maschenwerk darstellte, und das Licht schwach reflektirte. Die hintere Membran erschien graugelblich schimmernd und zeigte gegen die pars plana corporis ciliaris hin mässige Pigmenteinlagerungen. Das linke Auge wurde wegen periodisch auftretender, heftiger Schmerzen enucleirt; auf dem rechten Auge bestand Myopie mittleren Grades.

Der Bulbus sowie die einzelnen Präparate wurden hier demselben Verfahren unterworfen wie im ersten Falle. Das enucleirte Auge fühlte sich besonders in seiner hinteren Hälfte knochenhart an. Ein Durchschnitt des Auges — es ist das linke — läßt folgendes makroskopische Verhalten erkennen:

Die Duraalscheide ist hydropisch abgehoben, sie tritt durch äußerst zahlreiche Trabekel mit der Piaalscheide in Verbindung; der Sehnerv ist verkleinert, atrophisch, mißt ungefähr 1,5 mm. im Durchschnitte; die Netzhaut ist auch hier vollkommen abgelöst, zieht ganz ähnlich wie im Falle Königer als kegelförmiger Strang nach Vornen; dieser Kegel hat in seiner vorderen Basis kalkharte, graugrünliche Einlagerungen. Die Form der Knochenbildung ist hier ebenfalls eine becherförmige, indem die Knochenchale sich nach Innen an die Chorioidea und zwar an deren innerste Schichte anlegt und von der Spitze des Kegels, welchen die abgelöste Netzhaut bildet, durchbrochen wird; die dadurch entstandene Lücke mißt etwa 2 mm. im Durchmesser. Die Dicke des Knochens selbst beträgt im Maximum fast 2 mm. — Die Knochenbildung ist überhaupt von größerer Ausdehnung als im Falle Königer. Die Chorioidea ist auch hier an einer Stelle als in zwei Lamellen

getrennt zu erkennen, von deren innerer wiederum die fragile Neubildung ausgeht. Der Basis des Netzhautkegels liegt eine etwa 1 mm dicke, durchscheinende Lamelle auf, die mit der Iris durch zahlreiche Spangen verbunden erscheint. Das Linsensystem fehlt ganz; das Retinalepithel resp. dessen Pigment scheint auch hier zu fehlen; die Verknöcherungsschicht selbst ist von zahlreichen Lücken durchbrochen. Sie erstreckt sich ungleich weit nach Vornen, so daß eine starke Knochen- spange weit über den Äquator des Auges hinausreicht, während die Grenzen der übrigen Knochen- schale hinter demselben ab- schließen.

Mikroskopischer Befund.

Die Cornea war im Zustande einer geringgradigen ent- zündlichen Infiltration; die Conjunctiva erscheint normal, nur treten an einzelnen, wenigen Stellen die Kerne etwas zahl- reicher auf. An einer Stelle scheint die Iris mit der Cornea durch ein zartes, faseriges Gerüste in Verbindung zu stehen. Die Membrana Descemetii weist keinerlei Veränderungen auf. Die Chorioidea zeigt im Großen und Ganzen daselbe Ver- halten wie im Fall Königer, so daß die Unterschiede meist nur quantitativer Natur sind. So tritt besonders die Menge des haematogenen Pigments hervor, das mit den zahlreichen Blutextravasaten in der Chorioidea, besonders der Choriocapil- laris im Einklange steht. Diese Befunde sind immer in un- mittelbarer Nähe der Knochenneubildung anzutreffen. Auch die erwähnten drüsigen Gebilde trifft man, oft zu zweien oder dreien gruppiert, zahlreicher als im ersten Falle an.

Das Retinalepithel ist, wie sich schon makroskopisch ver- muthen ließe, nur spärlich vertreten und trägt keine oder nur schwach tingirte Kerne. Was nun die Verknöcherungsab- schnitte selbst betrifft, so schließt sich der eine direkt an die processus ciliares an, indem er dicht hinter demselben nach Innen in das Auge hineinragend, aus der innersten Schicht der Cho-

rioidea hervorgeht, während nun nach Rückwärts die Kontinuität der Knochenschichte mehr oder weniger unterbrochen wird, um bald wieder in eine zarte Knochenpange und sodann in eine Knochenbildung von größerem Umfange und -- auf dem Querschnitte -- von olivenblattförmiger Gestalt überzugehen. Das Ausmaafs der vorderen Schichte, die ungefähr die Gestalt eines gleichschenkligen Dreiecks hat, und an manchen Stellen viel neugebildetes Bindegewebe in den Hohlräumen einschließt, mag ungefähr 2 mm. betragen, während der andere Theil 8--10 mm. in der Länge und bis 2 mm in der Breite mißt. Charakteristisch ist für diese Knochenbildung nur das mässige, durch Hohlräume seltener unterbrochene Auftreten von Knochensubstanz, indem die Befunde sich ausserdem von dem schon im ersten Falle erwähnten wenig verschieden verhalten: deutliche Knochenkörperchen mit strahligen, ziemlich langen Ausläufern, zuweilen sehr hübsche lamelläre Anordnung, verhältnismässig zahlreiche Havers'sche Kanälchen, krümmelige Kalkeinlagerungen in mässiger Menge. In der nächsten Umgebung der Knochen ist das Chorioidealgewebe aufgelockert; man trifft hier zahlreiche, in Haematoxylin sehr deutlich gefärbte Kerne, desgleichen einzelne Herde weisser Blutkörperchen und allenthalben zerstreut: haematogenes Pigment; auch drüsige Einlagerungen von verschiedener Grösse und meist rundlicher Form sind in mässiger Zahl anzutreffen; ziemlich häufig ist Blut aus den meist erweiterten und prall gefüllten Kapillaren extravasirt.

Die hintere Knochenschichte zeichnet sich in ihrer Form dadurch aus, dass viele und lange, mehr oder weniger zarte Knochenpangen verhältnismässig grosse Hohlräume zwischen sich einschliessen und so ein zierliches Netzwerk bilden. Die Hohlräume selbst führen in mässiger Menge maschenförmig angeordnetes und mit spärlichen, in Haematoxylin gefärbten Kernen durchsetztes Bindegewebe; ferner trifft man in den Hohlräumen auf zuweilen strotzend gefüllte Blutgefässe, die

an einigen wenigen Stellen zu Blutextravasaten das Material geliefert zu haben scheinen. Der Verknöcherungsproceß geht auch hier wiederum von der innersten Schichte der Chorioidea aus und bietet alle, bereits oben erwähnten, charakteristischen Merkmale der Ossification dar. Besonders ausgeprägt ist nur der lamellöse Bau der Knochenmasse. Das haematogene Pigment ist auch hier reichlich vertreten.

Vor der Verwerthung dieser Befunde nun möge es gestattet sein, einige hier einschlägige Hauptsätze über die Knochenbildungen, wie sie sich aus den Untersuchungen von Kaffowitz („Normale Ossification, Rachitis und Syphilis“ in den Wiener medic. Jahrbüchern 1879, 2., 3. und 4. Heft) ergeben haben, vorher anzuführen.

„Das Wichtigste in der ganzen Lehre von der Ossification, schreibt der eben erwähnte Autor in seiner leider noch nicht abgeschlossenen Arbeit, ist und bleibt das allgemeine Gesetz, daß sich die harten Theile des Skelets nicht wie alle übrigen Gewebe des lebenden Körpers durch innere Wachsthumsvorgänge, durch Expansion, sondern ausschließlich durch Auflagerung neuer Theile an der Oberfläche vergrößern“. Weiterhin schreibt derselbe Autor in dem citirten Werke, S. 333 ff.:

„Ein weiterer, allgemeiner Gesichtspunkt, der sich aus unseren Untersuchungen über den Ossificationsproceß ergeben hat, ist die zeitliche und örtliche Continuität des lebenden Gewebes auch innerhalb des Knochenystems“.

Ferner: „Wir haben gesehen, daß sich das Bildungsge-
webe entweder direkt in Knochen verwandelt (wie bei der periostalen Ossification) oder zuerst in Knorpel übergeht; wir haben ferner gesehen, daß sich der Knorpel bei der Neubildung von Blutgefäßen innerhalb desselben, wieder in Bildungs-

gewebe verwandelt, und dafs er an den Rändern der auf diese Weise entstandenen Knorpelmarkräume, wenn die Vaskularisation nicht weiter fortschreitet, direkt in Knochengewebe übergeht, während beim Rückgang der Gefäfsbildung das aus dem Knorpel entstandene, weiche, fibrillenlose Bildungsgewebe in den Markräumen sich ebenfalls in Knochen verwandelt“. „Auch alle pathologischen Ossifikationen haben das Gemeinsame, dafs an den betreffenden Stellen eine reichliche Gefäfsentwicklung endlich zum Stillstande kommt. Es gilt dies sicherlich für die Knochenbildung auf entzündlicher Basis, für die Osteophyten bei der Periostitis, für den Callus, für Exostosen u. f. w. Dafs dann unter gewissen Umständen auch in Geweben, welche normaler Weise keine Knochen erzeugen, nach abgelaufenen akuten oder chronischen Entzündungen, nach traumatischen Reizungen, echtes Knochengewebe gebildet wird, dafs also auch permanente Knorpel, Muskel, Sehnen und Fascien, die Auskleidungen des Herzens und der grofsen Gefäfsse und viele andere Gewebe ossificiren, ist gar nicht mehr so auffallend, weil ja auch hier alle Bedingungen, die wir für die normale Ossifikation herausgefunden haben, mindestens ganz gut möglich sind“. „Auch die Ossifikationen in den verschiedenen Neubildungen können jene Bedingungen zweifellos gewähren“.

Diese Bedingungen nun, welche für das Zustandekommen des Ossificationsprocesses postuliert werden, und die, wie Kaffowitz ausdrücklich hervorhebt, für die pathologischen Verknöcherungen wesentlich dieselben sind wie für die normalen, sind in den beiden hier vorliegenden Fällen vollauf gegeben.

Zweifelsohne hat es sich um einen ausgedehnten entzündlichen Vorgang in der Chorioidea gehandelt; dafür sprechen wenigstens unter Anderem die erweiterten und strotzend gefüllten Kapillaren, die zahlreichen Anhäufungen diapedesirter weifser und rother Blutzellen, das haematogene Pigment, die jungen Bindegewebskerne. Ob und inwieweit mit diesem entzündlichen Vorgange die bestehende Myopie in atiologischem

Zusammenhange stand, möge dahingestellt bleiben; doch ist der Umstand, daß sich auf jedem der beiden, von der Verknöcherung verschont gebliebenen Augen ein ziemlich ausgedehntes Staphyloma posticum findet, mindestens der Beachtung in dieser Richtung werth.

Die Chorioidea hat offenbar ein plastisches Exsudat geliefert, das aber nicht auf die freie Fläche der Chorioidea gesetzt wurde, sondern unterhalb des Epithels in der innersten Lage der Chorioidea sich anhäufte. Die plastischen Exsudate haben aber, wie auch Goldzieher erwähnt, (Knapp und Hirschberg, Archiv für Augenheilkunde, Band IX S. 322 ff.) die Eigenschaft sich in feinste Fibrillen zu verwandeln; wie sollte die zum größten Theile in das eigentliche Chorioidealgewebe eingelagerte Fibrillenmasse anders gedeutet werden? In diesen Massen geht nun die Knochenbildung vor sich. Nach den direkten Beobachtungen von Kaffowitz hat man sich diesen Vorgang folgendermaßen zu vergegenwärtigen: Die Fibrillen entstehen nicht allein durch Umbildung aus den Zellen selbst, sondern auch durch Abspaltung aus der glashellen Intercellularsubstanz, die eben nach dem erwähnten Autor keine leblose Flüssigkeit, sondern mit den Attributen der Zelle, des organischen Protoplasma's, ausgestattet ist, deren feinere Struktur aber mit den jetzigen optischen Hilfsmitteln nicht genügend erschlossen werden kann. Ist diese Umbildung in ein Geflechtwerk bei gleichzeitiger Entwicklung von Gefäßräumen erfolgt, so beginnt die Kalkablagerung zwischen die Fibrillen und damit die eigentliche Knochenbildung. Mit diesen Beobachtungen von Kaffowitz stimmen vollkommen die von Goldzieher und Knapp überein. Das eigentliche, präformirte Gewebe der Chorioidea verknöchert nicht, wenn es auch bindegewebiger Natur ist. Denn der Satz O. Beckers, den er in seinem Lehrbuche über Linsenkrankheiten ausspricht: „Jedes Bindegewebe kann verknöchern“ ist etwas zu weit gefaßt, wenn man bedenkt, daß die Sklera, bindegewebige Narben der Cornea,

das Stroma der Chorioidea, das Corpus ciliare niemals Verknöcherungen aufweisen.

Eine weitere, offene und von Sattler (Graefe's Archiv f. O. Bd. XXII 2) in bejahendem Sinne beantwortete Frage ist die, ob und inwieweit die Lamina vitrea bei dem Verknöcherungsprozesse der Choriocapillaris eine Rolle spielt oder nicht. Sattler selbst stellte fest, daß diese Membran an ihrer Außenseite d. h. an der den Kapillaren zugewendeten Seite das Bild eines feinen Gitterwerks zeigt. Auch andere Forscher, so Iwanoff (Handbuch von Graefe-Saemisch Band I pg. 270) haben die Glashaut für faferig erklärt und in dieser ihrer Struktur soll nach dem eben angeführten Autor die Prädisposition für Fibrillenbildung und für sich daran anschließende Verknöcherungsprozesse gegeben sein. Dem gegenüber ist zu bedenken, daß jedenfalls in allen denjenigen Fällen, in welchen ein Entzündungsproceß mit Exsudatbildung in der Chorioidea statt hatte, die für die nicht vom Knorpel ausgehende Verknöcherung postulierten Fibrillen in der Exsudatmasse selbst zu suchen sein dürften und erst in zweiter Linie wäre dann die Lamina vitrea in Rücksicht zu ziehen. Dies gilt natürlich auch für die beiden vorliegenden Fälle von Chorioiditis, in denen überdies eine Lamina vitrea als solche nicht scharf zu unterscheiden war.

Zudem findet sich ja die Knochenbildung nicht direkt in der Lamina vitrea, sondern getrennt davon durch fibrilläres Gewebe.

Um endlich noch der Verknöcherungen in der Linse zu erwähnen, so ist die Ansicht, daß die Linse bei erhaltener Kapsel verknöchern könne, jedenfalls mit Reserve aufzunehmen; um so leichter findet jedoch bei verletzter Linsenkapsel durch Eindringen von Massen plastischen Exsudates in die Linsensubstanz selbst Knochenbildung statt.

Am Schlusse meiner Arbeit kann ich nicht umhin, meinen sämmtlichen Lehrern an der Universität München an dieser Stelle meinen innigsten Dank auszusprechen, insbesondere aber Herrn Privatdocent Dr. Oeller, der mir bei der Bearbeitung des vorliegenden Thema's in der liebenswürdigsten Weise behülflich war.

Das Bild der Natur ist nicht nur ein Spiegelbild der Natur, sondern es ist auch ein Ausdruck der menschlichen Seele. In der Natur finden wir die gleichen Gesetze, die auch in der menschlichen Seele wirken. Die Natur ist ein Buch, das uns lehrt, wie wir leben sollen. Wir müssen nur die Augen öffnen und die Natur beobachten, um die Weisheit zu entdecken, die in ihr verborgen ist.

Die Natur ist ein wunderbares Werk der Schöpfung. Sie zeigt uns die Schönheit und die Harmonie der Welt. In der Natur finden wir die gleichen Prinzipien, die auch in der menschlichen Seele wirken. Die Natur ist ein Buch, das uns lehrt, wie wir leben sollen. Wir müssen nur die Augen öffnen und die Natur beobachten, um die Weisheit zu entdecken, die in ihr verborgen ist.

Die Natur ist ein wunderbares Werk der Schöpfung. Sie zeigt uns die Schönheit und die Harmonie der Welt. In der Natur finden wir die gleichen Prinzipien, die auch in der menschlichen Seele wirken. Die Natur ist ein Buch, das uns lehrt, wie wir leben sollen. Wir müssen nur die Augen öffnen und die Natur beobachten, um die Weisheit zu entdecken, die in ihr verborgen ist.

Die Natur ist ein wunderbares Werk der Schöpfung. Sie zeigt uns die Schönheit und die Harmonie der Welt. In der Natur finden wir die gleichen Prinzipien, die auch in der menschlichen Seele wirken. Die Natur ist ein Buch, das uns lehrt, wie wir leben sollen. Wir müssen nur die Augen öffnen und die Natur beobachten, um die Weisheit zu entdecken, die in ihr verborgen ist.

Die Natur ist ein wunderbares Werk der Schöpfung. Sie zeigt uns die Schönheit und die Harmonie der Welt. In der Natur finden wir die gleichen Prinzipien, die auch in der menschlichen Seele wirken. Die Natur ist ein Buch, das uns lehrt, wie wir leben sollen. Wir müssen nur die Augen öffnen und die Natur beobachten, um die Weisheit zu entdecken, die in ihr verborgen ist.

Die Natur ist ein wunderbares Werk der Schöpfung. Sie zeigt uns die Schönheit und die Harmonie der Welt. In der Natur finden wir die gleichen Prinzipien, die auch in der menschlichen Seele wirken. Die Natur ist ein Buch, das uns lehrt, wie wir leben sollen. Wir müssen nur die Augen öffnen und die Natur beobachten, um die Weisheit zu entdecken, die in ihr verborgen ist.

